

Ļaundabīgo audzēju primārā diagnostika noteiktām lokalizācijām

Audzēja lokalizācijas vieta (diagnozes kods atbilstoši SSK-10 ar atvasinātajām klasifikācijām)	Ģimenes ārsta apmeklējuma laikā		Ļaundabīgo audzēju primārie diagnostiskie izmeklējumi			Speciālists, pie kura konsultācijas saņemšanai nosūta personu ar konstatētu atradi
	<i>Sūdzību un simptomu izvērtēšana</i>	<i>Fizikāla izmeklēšana un anamnēzes noskaidrošana</i>	<i>Laboratoriskie izmeklējumi</i>	<i>Vizuālās diagnostikas izmeklējumi</i>	<i>Citi izmeklējumi</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.Krūts (Z03.150)	1.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 1.1.1. pacientei vecumā no 30 gadiem ir neskaidrs veidojums krūtī ar/ bez sāpēm; 1.1.2. pacientei vecumā no 30 gadiem ir veidojums padusē; 1.1.3. pacientei vecumā no 50 gadiem ir sūdzības saistībā ar viena krūts gala: 1.1.3.1. izdalījumiem; 1.1.3.2.ievilkumumiem; 1.1.3.3.citām pārmaiņām vai sūdzībām.	1.2. Veic šādas pārbaudes: 1.2.1. krūšu un padušu apvidus apskati (deformācija, asimetrija, iztūpums, ievilkums, krūtsgala pārmaiņas); 1.2.2. krūšu un limfmezglu palpāciju, pārbaudot, vai nav: 1.2.2.1. veidojums vienā vai abās krūtīs, ar paceltām un nolaistām rokām; 1.2.2.2. palielināti limfmezgli vienā vai abās padusēs; 1.2.2.3. palielināti zem vai virs atslēgkaula limfmezgli vienā vai abās pusēs.	1.3.Netiek veikti.	1.4. Veic šādus izmeklējumus : 1.4.1. diagnostisko ultrasonogrāfiju sievietei līdz 35 gadu vecumam; 1.4.2. diagnostisko mamogrāfiju sievietei vecumā no 35 gadiem; 1.4.3. diagnostisko mamogrāfiju sievietei līdz 35 gadu vecumam gadījumos, ja iepriekšējos ultrasonogrāfijas izmeklējumos ir bijušas aizdomas par patoloģiju, kas nav pārliecinoši labdabīga.	1.5. Netiek veikti.	1.6. Nosūta pie ķirurga, kurš specializējies krūts slimību ārstēšanā uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 1.6.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; 1.6.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”; 1.6.3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”; 1.6.4. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”; 1.6.5. SIA “Piejūras slimnīca”.
2. Priekš-dziedzeris (Z03.161)	2.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus pacientiem vecumā no45 gadiem vai no 40 gadiem,	2.2. Veic digitāli rektālu priekšdziedera palpāciju, pārbaudot, vai nav izmainīta prostata (forma,	2.3. Veic prostatas specifiskā antigēna un brīvā prostatas specifiskā	2.4. Veic transrektālu ultrasonoskopiju ar biopsiju.	2.5. Netiek veikti.	2.6. Nosūta pie urologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 2.6.1. SIA “Rīgas

	ja ģimenes anamnēzē ir priekšdziedzera vēzis: 2.1.1. urinācijas traucējumi, kuri izpaužas šādi: 2.1.1.1. biežāka urinācija; 2.1.1.2. urinācija naktī; 2.1.1.3. strūklas pavājināšanās; 2.1.1.4. spiedoša vajadzība urinēt; 2.1.1.5. urīna retence; 2.1.1.6. grūtības uzsākt urināciju; 2.1.1.7. biežas urīnceļu infekcijas; 2.1.1.8. makrohematūrija	konsistence, lielums, sāpīgums, virsma).	antigēna koncentrācijas un dinamikas noteikšanu atbilstoši apstiprinātajām klīniskajām vadlīnijām.			Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; 2.6.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”; 2.6.3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”; 2.6.4. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”.
3. Āda, izņemot melanomu (Z03.144)	3.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 3.1.1. ilgstoši nedzīstošs ādas pušums, plaisājums, apsārtums, zvīņošana, krevelošana; 3.1.2. nesāpīgs ādas izcilnis (perlamutrveida mezgliņš), kas pakāpeniski palielinās, veidojums ar vaļņveida maliņām; 3.1.3. teleangiektāzijas pa veidojuma perifēriju	3.2. Veic visa ķermeņa ādas apskati, pārbaudot, vai nav patoloģisku veidojumu uz ķermeņa ādas.	3.3. Veic ādas nospieduma citoloģisku izmeklēšanu.	3.4. Netiek veikti	3.5. Netiek veikti	3.6. Nosūta pie ķirurga uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 3.6.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; 3.6.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”; 3.6.3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”; 3.6.4. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”; 3.6.5. SIA “Piejūras slimnīca”.
4. Resnā un taisnā zarna (Z03.118; Z03.119;	4.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 4.1.1. pacientam vecumā no 40 gadiem ir svara	4.2. Veic šādas pārbaudes: 4.2.1. ādas novērtēšanu (anēmija, dzelte, turgors); 4.2.2. vēdera palpāciju	4.3. Veic šādus izmeklējumus: 4.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu	4.4. Veic šādus izmeklējumus : 4.4.1. rentgenkontrast-izmeklēšanu ar	4.5. Netiek veikti.	4.6. Nosūta pie ķirurga uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 4.6.1. SIA “Rīgas

Z03.120)	zudums bez konstatēta iemesla un sāpes vēderā; 4.1.2. pacientam vecumā no 50 gadiem ir neizskaidrojami asiņaini izdalījumi no taisnās zarnas; 4.1.3. pacientam vecumā no 60 gadiem ir dzelzs deficīta anēmija un/ vai vēdera izejas traucējumi; 4.1.4. pacientam vecumā līdz 50 gadiem (ieskaitot) ir asiņaini izdalījumi no taisnās zarnas un kāds no šādiem simptomiem: 4.1.4.1. sāpes vēderā; 4.1.4.2. vēdera izejas traucējumi; 4.1.4.3. svara zudums; 4.1.4.4. dzelzs deficīta anēmija; 4.1.5. taustāms veidojums vēderā vai taisnajā zarnā.	(sāpīgums, veidojumi); 4.2.3. aknu apvidus palpāciju (sāpīgums, aknu robežas, aknu malas virsma, konsistence, izmēri); 4.2.4. cirkšņu limfmezglu palpāciju.	grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav: 4.3.1.1. anēmija; 4.3.1.2. leukocitoze; 4.3.1.3. palielināts eritrocītu grimšanas ātrums; 4.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīts: 4.3.2.1. feritīns; 4.3.2.2. alanīnaminotransferāze; 4.3.2.3. sārmainā fosfotāze; 4.3.2.4. laktātdehidrogenāze; 4.3.2.5. kreatinīns; 4.3.4. slēptas asinis fēcēs.	bāriju; 4.4.2.kolonoskopiju ar biopsiju		Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; 4.6.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”; 4.6.3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”; 4.6.4. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”; 4.6.5. SIA “Piejūras slimnīca”
5. Bronhi un plaušas (Z03.134)	5.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 5.1.1. pacientam ir neizskaidrojama asiņu atklepošana (punktiņi, sfīdriņas, putaini rozā krēpas, asiņu recekļi); 5.1.2. smēķētājam vai bijušajam smēķētājam ar 30 paciņģadu smēķēšanas anamnēzi, kuri ir vecumā no 50 gadiem, novēro: 5.1.2.1. persistējošu klepu	5.2. Veic šādas pārbaudes: 5.2.1. plaušu salīdzinošo perkusiju un auskultāciju; 5.2.2. noskaidro smēķēšanas anamnēzi, iegūstot informāciju: 5.2.2.1. no kāda vecuma smēķē vai smēķējis; 5.2.2.2. cik cigaretes dienā smēķē vai smēķējis; 5.2.2.3. paciņģadu skaitu (cigarešu skaits dienā reizināts ar smēķēšanas	5.3. Veic šādus izmeklējumus: 5.3.1. nosaka pilnu asinsainu; 5.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē vai nav izmainīta: 5.3.2.1. alanīnaminotransferāze; 5.3.2.2. C reaktīvais olbaltums; 5.3.3. veic krēpu (ja tādas ir) mikrobioloģisko	5.4. Veic krūšu kurvja orgānu rentgenogrāfiju	5.5. Netiek veikti.	5.6. Nosūta pie pneimonologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 5.6.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; 5.6.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”; 5.6.3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”; 5.6.4. SIA “Liepājas

	<p>ilgāk nekā 3 nedēļas vai novēro klepus rakstura pārmaiņas; 5.1.2.2. sāpes krūtīs (elpojot, klepojot); 5.1.2.3. aizdusu; 5.1.2.4. sāpīgu elpošanu; 5.1.2.5. persistējošu vai recidivējošu dziļo elpceļu (plaušu) infekciju; 5.1.2.6. svara zudumu; 5.1.3. pacientam persistē vairāk nekā divi sekojoši simptomi un sūdzības, bez konstatēta iemesla: 5.1.3.1. smēķētājs vai bijušais smēķētājs; 5.1.3.2. klepus ilgāk nekā trīs nedēļas vai novēro klepus rakstura pārmaiņas; 5.1.3.3. sāpes krūtīs vai plecos (elpojot, klepojot); 5.1.3.4. aizdusa; 5.1.3.5. sāpīga elpošana; 5.1.3.6. persistējošas vai biežas dziļo elpceļu (plaušu) infekcijas; 5.1.3.7. paaugstināta ķermeņa temperatūra; 5.1.3.8. svara zudums; 5.1.3.9. apetītes zudums; 5.1.3.10. nogurums, nespēks; 5.1.3.11. pulksteņstikla nagi; 5.1.3.12. palielināti kakla</p>	<p>ilgumu gados); 5.2.3. noskaidro arodkaitīgumu (azbests). 5.2.4. noskaidro saslimstību ar ļaundabīgiem audzējiem ģimenē; 5.2.5. precizē, kad iepriekš veikti krūšu kurvja orgānu radioloģiskie izmeklējumi un kādi bija to rezultāti.</p>	<p>izmeklēšanu uz <i>M. tuberculosis</i>.</p>			<p>reģionālā slimnīca”.</p>
--	--	--	---	--	--	-----------------------------

	vai virs vai zem atslēgas kaula limfmezgli.					
6. Kuņģis (Z03.116)	6.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 6.1.1. disfāģija; 6.1.2. pacientam vecumā no 55 gadiem ir svara zudums un kāds no šādiem simptomiem: 6.1.2.1. sāpes epigastrijā, tai skaitā kombinācijā ar zemu hemoglobīna līmeni; 6.1.2.2. gastroezofageālā atviļņa slimība; 6.1.3. pacientam vecumā no 55 gadiem ir kāds no šādiem simptomiem: 6.1.3.1. dispepsija, tai skaitā, ja tā nepadodas ārstēšanai; 6.1.3.2. trombocitoze, tai skaitā kombinācijā ar šķebināšanu, vemšanu, svara zudumu, gastroezofageālā atviļņa slimību, dispepsiju vai sāpēm epigastrijā; 6.1.3.3. šķebināšana un vemšana, tai skaitā kombinācijā ar svarā zudumu, gastroezofageālā atviļņa slimību, dispepsiju vai sāpēm epigastrijā; 6.1.4. asiņu atvemšana.	6.2. Veic šādas pārbaudes: 6.2.1. ādas novērtēšanu (bālums, dzelte, kaheksija, turgors); 6.2.2. kakla, zem un virsatslēgkaula, kā arī paduses limfmezglu palpāciju; 6.2.3. vēdera palpāciju (sāpīgums, veidojumi); 6.2.4. aknu apvidus palpāciju (aknu robežas, aknu malas virsma, konsistence, izmēri).	6.3. Veic šādus izmeklējumus: 6.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav: 6.3.1.1. anēmija; 6.3.1.2. leukocitoze; 6.3.1.3. trombocitoze; 6.3.1.4. palielināts eritrocītu grimšanas ātrums; 6.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē vai nav izmainīts: 6.3.2.1. feritīns; 6.3.2.2. gamma glutamīntransferāze; 6.3.2.3. alanīnaminotransferāze; 6.3.2.4. sārmainā fosfatāze; 6.3.2.5. laktātdehidrogenāze; 6.3.2.6. kreatinīns.	6.4. Veic šādus izmeklējumus: 6.4.1. rentgenkontrast-izmeklēšanu ar bāriju ; 6.4.2. gastrokopiju ar biopsiju.	6.5. Netiek veikti.	6.6. Nosūta pie ķirurga uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 6.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"; 6.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"; 6.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"; 6.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"; 6.6.5. SIA "Piejūras slimnīca".
7. Nieres (Z03.164;	7.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:	7.2. Veic šādas pārbaudes: 7.2.1. nieru apvidus	7.3. Veic šādus izmeklējumus:	7.4. Veic šādus izmeklējumus:	7.5. Netiek veikti.	7.6. Nosūta pie urologa uz kādu no šādām

Z03.165)	7.1.1. pacientam vecumā no 45 gadiem ir kāds no šādiem simptomiem: 7.1.1.1. neizskaidrojama makrohematūrija bez konstatētas urīnceļu infekcijas; 7.1.1.2. persistējoša makrohematūrija, tai skaitā tās periodiska atkārtšanās pēc urīnceļu infekcijas izārstēšanas; 7.1.2. sārts urīns; 7.1.3. sāpes sānos.	7.2.2. padušu un cirkšņu limfmezglu palpāciju.	7.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav: 7.3.1.1. anēmija; 7.3.1.2. leukocitoze; 7.3.1.3. palielināts eritrocītu grimšanas ātrums; 7.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē vai nav izmainīts: 7.3.2.1. kreatinīns; 7.3.2.2. glomerulu filtrācijas ātrums; 7.3.2.3. laktātdehidrogenāze; 7.3.3. veic urīna analīzi, pārbaudot eritrocītu vai baktēriju esamību, kā arī citoloģisku izmeklēšanu.	7.4.1. veic vēdera dobuma ultrasonogrāfiju; 7.4.2. vēdera dobumu orgānu datortomogrāfiju ar kontrastvielas ievadīšanu, ja ultrasonogrāfijā izmaiņas nekonstatē, bet saglabājas simptomi, sūdzības un ir laboratoriska atradne	ārstniecības iestādēm: 7.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"; 7.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"; 7.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"; 7.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca".	
8. Urīnpūslis (Z03.167)	8.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 8.1.1. pacientam vecumā no 45 gadiem ir kāds no šādiem simptomiem: 8.1.1.1. neizskaidrojama makrohematūrija bez konstatētas urīnceļu infekcijas; 8.1.1.2. persistējoša vai periodiska makrohematūrija pēc urīnceļu infekcijas izārstēšanas; 8.1.2. pacientam vecumā no 60 gadiem ir kāds no	8.2. Veic šādas pārbaudes: 8.2.1. ādas novērtēšanu (bālums, kaheksija, turgors); 8.2.2. vēdera palpāciju (sāpīgums, veidojumi); 8.2.3. cirkšņu limfmezglu palpāciju.	8.3. Veic šādus izmeklējumus: 8.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav: 8.3.1.1. anēmija; 8.3.1.2. leukocitoze; 8.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē vai nav izmainīts: 8.3.2.1. feritīns; 8.3.2.2. sārmainā fosfotāze (SF); 8.3.2.3. laktātdehidrogenāze;	8.4. Veic vēdera dobuma un mazā iegurņa dobuma orgānu ultrasonogrāfiju.	8.5. Cistoskopija.	8.6. Nosūta pie urologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 8.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"; 8.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"; 8.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"; 8.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca".

	<p>šādiem simptomiem: 8.1.2.1. neizskaidrojama mikrohematūrija un dizūrija; 8.1.2.2. leukocitoze; 8.1.3. atkārtotas un biežas urīnceļu infekcijas pacientam vecumā no 60 gadiem; 8.1.4. pūšļa nepilnīgas iztukšošanās sajūta.</p>		<p>8.3.2.4. kreatinīns; 8.3.2.5. CRO kvantitatīvi; 8.3.3. veic urīna analīzi, pārbaudot šūnu rādītājus (leikocīti, eritrocīti (mikro vai makrohematūrija)), kā arī citoloģisku izmeklēšanu (atipiskas vai audzēja šūnas).</p>			
9. Aizkuņģa dziedzeris (Z03.125)	<p>9.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 9.1.1. pacientam vecumā no 40 gadiem ir dzelte; 9.1.2. pacientam vecumā no 60 gadiem ir svara zudums un kāds no šādiem simptomiem: 9.1.2.1. caureja; 9.1.2.2. sāpes mugurā; 9.1.2.3. sāpes vēderā; 9.1.2.4. šķebcināšana; 9.1.2.5. vemšana; 9.1.2.6. aizcietējums; 9.1.2.7. nesen sācies diabēts.</p>	<p>9.2. Veic šādas pārbaudes: 9.2.1. ādas novērtēšanu (dzelte, kaheksija, bālums, turgors); 9.2.2. vēdera palpāciju (sāpīgums, veidojumi); 9.2.3. aknu apvidus palpāciju (aknu malas virsma, konsistence, izmēri, aknu robežas).</p>	<p>9.3. Veic šādus izmeklējumus: 9.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav: 9.3.1.1. anēmija; 9.3.1.2. leukocitoze; 9.3.1.3. palielināts eritrocītu grimšanas ātrums; 9.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē vai nav izmainīts: 9.3.2.1. bilirubīns; 9.3.2.2. ALAT – alanīnaminotransferāze; 9.3.2.3. gamma glutamīntransferāze; 9.3.2.4. sārmainā fosfatāze; 9.3.2.5. laktātdehidrogenāze; 9.3.2.6. kreatinīns; 9.3.2.7. glikozes līmenis asinīs;</p>	<p>9.4. Veic šādus izmeklējumus: 9.4.1. vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfiju 9.4.2. vēdera dobuma datortomogrāfiju ar kontrastvielas ievadīšanu, ja konstatētas izmaiņas laboratoriskos izmeklējumos un vēdera dobuma ultrasonogrāfijā</p>	<p>9.5. Netiek veikti.</p>	<p>9.6. Nosūta pie ķirurga uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 9.6.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; 9.6.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”; 9.6.3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”; 9.6.4. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”; 9.6.5. SIA “Piejūras slimnīca”.</p>

			9.3.3. veic kopprogrammu, lai pārbaudītu, vai nav steatoreja.			
10. Dzemdies ķermenis (Z03.154)	10.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 10.1.1. neizskaidrojama vagināla asiņošana menopauzē (vairāk kā 12 mēnešus pēc pēdējām menstruācijām); 10.1.2. pacientei vecumā no 55 gadiem ir neskaidri izdalījumi no maksts, kurus: 10.1.2.1. konstatē pirmo reizi menopauzē; 10.1.2.2. pavada	10.2. Veic šādas pārbaudes: 10.2.1. ādas novērtēšanu (bālums, dzelte, tūskainība, aptaukošanās); 10.2.2. vēdera lejas daļas un cirkšņu apvidus palpāciju.	10.3. Veic šādus izmeklējumus: 10.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav: 10.3.1.1. anēmija; 10.3.1.2. trombocitoze; 10.3.1.3. palielināts eritrocītu grimšanas ātrums; 10.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē vai nav izmainīta:	10.4. Veic transvaginālu ultrasonogrāfiju.	10.5. Netiek veikti.	10.6. Nosūta pie ginekologa vai onkoloģijas ginekologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 10.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"; 10.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"; 10.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"; 10.6.4. SIA "Liepājas

	trombocitoze; 10.1.2.3. pavada mikro vai makrohematūrija; 10.1.3. pacientei vecumā no 55 gadiem ir makrohematūrija, tai skaitā ar kādu no šādiem simptomiem: 10.1.3.1.zems hemoglobīna līmenis; 10.1.3.2. trombocitoze; 10.1.3.3. paaugstināts glikozes līmenis.		10.3.2.1. sārmainā fosfotāze; 10.3.2.2. laktātdehidrogenāze; 10.3.2.3. kreatinīns; 10.3.2.4. glikozes līmenis asinīs.			reģionālā slimnīca”; 10.6.5. SIA “Piejūras slimnīca”.
11.Olnīcas (Z03.156)	11.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 11.1.1. sāpes vēderā, pilnuma sajūta, vēdera pūšanās; 11.1.2. vēdera apjoma palielināšanās bez svara palielinājuma; 11.1.3. taustāms veidojums vēderā; 11.1.4. pacientei vecumā no 50 gadiem ir kāds no šādiem simptomiem (biežāk par 12 reizēm mēnesī): 11.1.4.1. vēdera pūšanās; 11.1.4.2. priekšlaikus sāta sajūtas iestāšanās un apetītes samazināšanās; 11.1.4.2. sāpes vēderā vai iegurnī; 11.1.4.3. biežāka urinēšana vai spiedoša vajadzība	11.2. Veic vēdera lejas daļas un cirkšņu apvidus palpāciju.	11.3. Veic šādus izmeklējumus: 11.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav: 11.3.1.1.anēmija; 11.3.1.2. leikocitoze; 11.3.1.3. palielināts eritrocītu grimšanas ātrums; 11.3.1 veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē vai nav izmainīts: 11.3.1.1.a – fetoproteīns; 11.3.1.2. sārmainā fosfotāze; 11.3.1.3. laktātdehidrogenāze; 11.3.1.4. audzēju marķieris CA-125.	11.4. Veic šādus izmeklējumus: 11.4.1. vēdera un iegurņa dobuma orgānu ultrasonogrāfiju ; 11.4.2. vēdera un iegurņa dobumu orgānu datortomogrāfiju, ja konstatēts paaugstināts audzēju marķieris CA-125 un citos izmeklējumos konstatētas izmaiņas	11.5. Netiek veikti.	11.6. Nosūta pie ginekologa vai onkoloģijas ginekologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 11.6.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; 11.6.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”; 11.6.3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”; 11.6.4. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”; 11.6.5. SIA “Piejūras slimnīca”.”

	11.1.5. neizskaidrojams svara zudums, nespēks, nogurums un vēdera izejas pārmaiņas; 11.1.6. vismaz divām pirmās vai otrās pakāpēs radniecēm ir bijis olnīcu vai krūts vēzis līdz 50 gadu vecumam.					
--	--	--	--	--	--	--